

# Valoración de la aplicación del tamizaje universal de dislipemias, en la población pediátrica de Argentina


Dra. Natalia Etcheverry, Dra. M. Beatriz Araujo, Dra. Ariela Agusthino,  
Dra. Silvina Cuartas, Dra. Mariel Torre



# Resultados




- CABA
- AMBA
- C+ordoba
- Bs. As. Prov.
- Sta. Fé
- E. Ríos
- Neuquén
- Mendoza
- R. Negro
- San Juan
- T. del Fuego
- Misiones
- Santa Cruz
- Chubut
- Salta
- Formosa
- Catamarca
- Corrientes
- La Pampa
- Tucumán
- San Luis
- S. del E
- Jujuy
- La Rioja




- Se obtuvieron 310 encuestas de todas las Provincias

## Distribución por edad



- Edad promedio de 46,4 años
- Un rango de edad de 27 a 79 años.


## Realiza Tamizaje



- No le parece adecuado
- Piensan que lo padres se negarían
- Solo si tienen FR

# Resultados

¿Ante el diagnóstico, tiene conocimientos para la toma de decisiones?



- No se obtuvo información sobre cuantos pacientes fueron diagnosticados y si se trataron

Supo a quién derivar



- No hay especialistas: Catamarca, Santa cruz , San Luis, S.del Estero, Jujuy, La Rioja y T. del Fuego.
- CABA un 8,5% no sabe a quien derivar

Interés/Deriva



- Inf. Para tratar
- Deriva, sin interes por inf.

# Conclusiones

---

- ✓ Se pudo obtener información sobre el diagnóstico de dislipemias a través de la encuesta pero no cantidad de pacientes diagnosticados
  - ✓ No hay completa realización del tamizaje universal a los 6 años
  - ✓ Estimamos que la ausencia del tamizaje es por desconocimiento de la importancia del mismo
  - ✓ Por lo tanto se deberá trabajar para continuar promoviendo esta herramienta diagnóstica costo-efectiva favorable
-